

Isocox

— Uso Veterinario

Agente anticoccidial para bovinos, ovinos y porcinos

Composición:

Cada 100 mL de producto contiene:

Toltrazuril 5,00 g

Excipientes c.s.p 100,00 mL

Indicaciones:

Isocox es un agente anticoccidial para porcinos, bovinos y ovinos.

Porcinos: Indicado para profilaxis y tratamiento de coccidiosis ocasionada por *Isospora suis*.

Bovinos y ovinos: Indicado en la profilaxis, metafilaxis y tratamiento de la coccidiosis bovina ocasionada por *Eimeria bovis* y *Eimeria zuernii* y coccidiosis ovina causada por *Eimeria crandallis* y *Eimeria ovinoidalis*.

Modo de Uso y Dosis:

Porcinos: La coccidiosis causa diarrea principalmente en lechones con edad entre 5 a 30 días. **Isocox** actúa en todas las fases de desarrollo del parásito y debe ser administrado a toda camada a partir del tercer día de

vida como profilaxis de la coccidiosis en la siguiente dosis:

1 mL de **Isocox** para cada lechón (equivalente a 20 mg/kg de peso). Para tratamiento, utilizar la dosis de 1 mL de **Isocox** para cada 2,5 kg de peso de los animales (equivalente a 20 mg/kg de peso). En casos de granjas con alto desafío, la dosis puede ser repetida tras 5 días o a criterio del médico veterinario.

Bovinos y ovinos: La coccidiosis bovina y ovina acomete principalmente animales jóvenes, también presentando alteraciones gastrointestinales y cuadros variables de diarrea. **Isocox** debe ser administrado en bovinos en la dosis de 3 mL/10 kg de peso vivo (equivalente a 15 mg/kg de Toltrazuril) por la vía oral en dosis única. En ovinos, administrar en la dosis de 1 mL/2,5 kg de peso vivo (equivalente a 20 mg/kg de Toltrazuril) por la vía oral en dosis única.

Instrucciones para administración:

Frascos de 100 mL: Para montar el frasco dosificador, retirar el sello de seguridad, atascar el aplicador y agitar el frasco. Girar la válvula del aplicador hacia indicado y presionarlo varias veces hasta el producto aparecer en la parte superior del pico regulador. Después, realizar la contención adecuada del animal e insertar el pico regulador en su boca. Presionar la válvula del aplicador hasta el fin. Cada rociado (movimiento de la válvula) administra 1 mL de producto.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4

El aplicador es destinado para facilitar la administración de pequeños volúmenes de **Isocox**, de manera que el producto puede ser utilizado con la ayuda de jeringa o pistola reguladora adecuada, de acuerdo con el peso de los animales a ser tratados, respetándose la dosis indicada para cada especie.

Frascos de 250 mL y 1 L: Retirar el sello de seguridad y agitar el frasco. Con jeringa o pistola reguladora adecuada y ante la contención del animal, aplicar el producto por la vía oral.

Precauciones:

Agitar bien el frasco antes de usar. Obedecer las dosis recomendadas para uso del producto. Solamente el médico veterinario puede hacer alteraciones en las dosis del producto. No utilizar el producto con plazo de caducidad vencido.

Tiempo de Retiro:

Bovinos:

Carne: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 63 días después de finalizado el tratamiento.

Leche: Este producto no debe ser aplicado en hembras productoras de leche para consumo humano.

Ovinos:

Carne: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 67 días después de finalizado el tratamiento.

Leche: Este producto no debe ser aplicado en hembras productoras de leche para consumo humano.

Porcinos:

Carne: Los animales tratados no deben sacrificarse para consumo humano hasta 77 días después de finalizado el tratamiento.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No hay. El Toltrazuril puede ser asociado a suplementos de hierro para lechones bien como antibióticos como enrofloxacin, gentamicina, sulfa y colistina.

Reacciones adversas:

Puede ocurrir vómito. Caso ocurra, administrar de nuevo.

Consulte al médico veterinario.
Venta bajo prescripción del médico veterinario.
Su venta requiere receta médica.

Conservar en local seco y fresco, en temperatura entre 15°C y 30°C, protegido de la luz solar intensa. Mantener fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508.

Importado y distribuido por: **Bolivia:** SENASAG Reg. PUV - N.º 003397/08 - Servi-Insumos Bolivia Import Export SRL - Santa Cruz de la Sierra, Bolivia / **Colombia:** REG. ICA N.º 7825 - MV - Ouro Fino Colombia S.A.S. - Calle 4 Sur 43 a 195 Oficina 222 Bloque B - Medellín, Colombia - Tel.: (57) 4 366-1429 / **Costa Rica:** Reg. MAG MV-4136 / **Ecuador:** Reg.: RIP-FAR-255-AGROCALIDAD - PRODUCTOS NUTRICIÓN Y SERVICIOS PRONUTROS CIA. LTDA - Gaspar de Escalona N39-29 y Granda Centeno, Quito, Ecuador / **Guatemala:** Reg.: BR211-42-17-14450 / **Honduras:** Reg.: MV-1-6774 / **México:** Reg.: Q-7750-079 - Ouro Fino de México S.A de C.V - Av. Real Acueducto No. 335, Int. 1204, Col. Real Acueducto, C.P. 45116, Zapopan, Jalisco, México / **Nicaragua:** Reg.: MV-7904 / **Panamá:** Reg.: MV-8507 / **Paraguay:** Reg.: SENACSA 10.676 - Agroveterinaria Proveta de Manuel Carvallo Hab. N.º 894. Direc.Tec.: Dr. Manuel Carvallo. Reg.Prof. 429 / **Perú:** Reg.: SENASA F.064.085.I.00125 - INVERSIONES NORVET S.A.C. - Jr. José De la Torre Ugarte N.º 368, Oficina 203, Lince, Lima - Perú.

KIT 50006056/12

Elaborado por:
Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofino.saudeanimal.com
Hecho en Brasil