



Fluatac DUO

Leer la etiqueta antes de usar el producto
Manténgase fuera del alcance de los niños

Precauciones y advertencias de su uso y aplicación:

Evite el contacto directo con la piel. En caso de exposición accidental lavar con abundante agua.

Se recomienda el uso de guantes de goma para la manipulación y para la aplicación del producto.

El producto no deberá ser administrado sobre los animales en períodos de lluvias intensas cuando se encuentren a campo abierto dado que puede afectarse la eficacia del tratamiento.

Extremadamente tóxico para organismos acuáticos.

Altamente tóxico para abejas. Puede matar abejas y polinizadores. No aplicar en presencia de abejas, en horas de alta actividad de abejas o en época de floración del cultivo.

Instrucciones de primeros auxilios:

Si ocurre intoxicación accidental, proceder de la siguiente manera: Retirar las ropas contaminadas, y lavar las partes del cuerpo afectadas, con agua y jabón. Busque la ayuda de un médico.

Si el producto entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua abundante, durante 15 minutos.

Antídoto y Tratamiento Médico:

No hay. El tratamiento debe ser sintomático.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrele una copia de esta etiqueta.

Medidas en caso de envenenamiento:

En caso de intoxicación del animal, llamar al médico veterinario.

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente.

Medidas para Protección del Medio Ambiente: No contaminar ríos u otras fuentes de agua.

Respetar las franjas de seguridad con relación a cuerpos de agua.

Almacenamiento y Manejo del Producto:

Obedecer a las dosificaciones recomendadas para uso del producto.

No utilizar el producto con plazo de validez expirado.

Tras abierto el empaque, utilizar el producto en hasta 4 meses.

No fumar y no manipular alimentos durante la aplicación del producto.

La exposición directa a la luz solar o a altas temperaturas podrá degradar el producto.

Conservar en lugar seco y fresco, entre 15°C y 30°C, al abrigo de la luz solar directa.

Condiciones de manejo y disposición de desechos y envases vacíos:

NINGÚN ENVASE QUE HAYA CONTENIDO PLAGUICIDAS DEBE UTILIZARSE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ALEJADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

CORROSIVOS, CAUSA DAÑO IRREVERSIBLE A LOS OJOS.

La disposición final de los envases y producto no utilizado debe acoger a planes de recolección posconsumo en los puntos más cercanos de la región.

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta el agua en la mezcla de aplicación. Luego destrúyalo.

Uso Veterinario

Producto líquido para uso Pour On.

Composición:

Fluazurón (N-[[4-chloro-3-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2yl]oxyphenyl]carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide)	3,00 g (3,00% p/v)
Abamectina (5-o-demetilavermectina A1a e 5-o-demetil-25-de (1- metilpropil)-25-(1-metiletil) avermectina A1a (4:1)	0,50 g (0,50% p/v)
Excipientes c.s.p.	100,0 mL (100% p/v)

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni CRMV/SP 24.508

Reg. ICA 9908-MV

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330 km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
CNPJ: 57.624.462/0001-05
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil

Importado y distribuido por:

Ouro Fino Colombia S.A.S. – Calle 4 Sur
43 a 195 Oficina 222 Bloque B – Medellín,
Colombia – Tel.: (57) 4 366-1429

Uso pecuario

Indicaciones:

Fluatac Duo ayuda en programas de control estratégico de garrapatas *Rhipicephalus (Boophilus) microplus*, de moscas *Haematobia irritans* y de larvas de la mosca *Dermatobia hominis*. Indicado en el tratamiento de parasitosis bovinas asociadas a estadios adultos de los nematodos gastrointestinales *Haemonchus placei*, *Cooperia punctata*, *Cooperia spatulata*, *Oesophagostomum radiatum*, *Trichostrongylus axei* y *Trichuris discolor*.

Modo de Uso y Dosificación:

Se debe administrar Fluatac Duo por vía tópica (pour on) con aplicación en la línea dorsal de los bovinos (hilo del lomo) en la dosis de 1 mL para cada 10 kg. Producto para aplicación en dosis única.

Precauciones y contraindicaciones especiales del producto:

El producto, cuando usado en las dosificaciones indicadas, no provoca reacciones adversas. Sin embargo, reacciones de hipersensibilidad individual pueden ocurrir. No se conoce ninguna interacción medicamentosa con los principios activos.

Seguridad:

No aplicar en becerros con edad inferior a 16 semanas.

PRODUCTO INDICADO EXCLUSIVAMENTE PARA BOVINOS DE CARNE. NO UTILIZAR EN VACAS PRODUCTORAS DE LECHE PARA CONSUMO HUMANO.

TIEMPO DE RETIRO:

LOS BOVINOS TRATADOS NO DEBEN SACRIFICARSE PARA CONSUMO HUMANO HASTA 60 DÍAS DESPUÉS DE FINALIZADO EL TRATAMIENTO.

NO SE DEBE APLICAR ESTE PRODUCTO EN HEMBRAS BOVINAS PRODUCTORAS DE LECHE PARA EL CONSUMO HUMANO.

El fabricante garantiza que las características físico químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que mediante registro oficial de venta se verificó que es apto para los fines aquí recomendados de acuerdo con las indicaciones de empleo.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ESTE PRODUCTO ES INDICADO PARA POBLACIONES SENSIBLES A LOS ANTIPARASITARIOS EN CUESTIÓN DE ACUERDO CON LA ORIENTACIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO DE LA PROPIEDAD



MEDIANAMENTE TÓXICO
CLASIFICACIÓN TOXICOLÓGICA III
CUIDADO

