

Desflan Ourofino

Uso Veterinario

Antiinflamatorio, analgésico y antipirético.
Solución inyectable.

Fórmula:

Cada 100 mL contiene:

Flunixin (Meglumina)* 5,0 g

Excipientes c.s.p. 100,0 mL

*Equivalente a 8,3 g de Flunixin Meglumina

Indicaciones:

Desflan Ourofino es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo (AINE) a base de flunixin meglumina recomendada para el tratamiento de la inflamación aguda en bovinos y equinos, y además tiene un efecto analgésico relevante sobre el dolor derivado de procesos inflamatorios.

Los AINE, como la flunixin meglumina, actúan bloqueando la actividad de las ciclooxigenasas y la cadena de producción del ácido araquidónico. Este bloqueo inhibe la producción de mediadores inflamatorios como las citoquinas. En este sentido, los estudios realizados con **Desflan Ourofino** han demostrado la eficacia del producto en la reducción de las citoquinas proinflamatorias y también en la reducción de los signos de dolor derivados del proceso inflamatorio.

Modo de Uso y Dosificación:

Equinos:

Desflan Ourofino puede administrarse por vía intramuscular o intravenosa, a una dosis de 1 mL de **Desflan Ourofino** (correspondiente a 1,1 mg/kg de flunixin meglumina) por cada 45 kg de peso vivo, una vez al día. El tratamiento se puede repetir cada 24 horas hasta por 5 días consecutivos.

Bovinos:

Desflan Ourofino puede administrarse por vía intramuscular o intravenosa en bovinos, a una dosis de 1 a 2 mL de **Desflan Ourofino** (correspondientes a 1,1 a 2,2 mg/kg de flunixin meglumina) por cada 45 kg de peso vivo, una vez al día. El

tratamiento se puede repetir cada 24 horas hasta por 5 días consecutivos.

Precauciones:

Cumplir con las dosis recomendadas para el uso del producto. Se debe tener cuidado para evitar la aplicación intraarterial del producto. En caso de administración intraarterial, los signos pueden ser ataxia, falta de coordinación, hiperventilación y debilidad muscular. En tratamientos prolongados, pueden ocurrir discrasias sanguíneas como agranulocitosis y leucopenia. Utilice en hembras bovinas gestantes únicamente bajo evaluación del Médico Veterinario. La flunixin meglumina actúa bloqueando las ciclooxigenasas, lo que resulta en la disminución de la producción de prostaglandinas, importantes en la regulación del inicio y progreso del parto. El uso en animales menores de 6 semanas de edad podría implicar un riesgo adicional. Si tal uso no puede ser evitado, los animales podrían requerir una dosis reducida y un seguimiento clínico cuidadoso.

Precauciones en humanos:

¡Peligro! Provoca daños si se ingiere. No ingerir. En caso de ingestión accidental, no provocar el vómito, consultar inmediatamente al médico, llevándose el envase completo del producto. Conservar el producto en su embalaje original. No reutilice el embalaje. Los restos de productos y envases deben eliminarse según lo recomendado por la legislación vigente, evitando la contaminación del medio ambiente.

Contraindicaciones y limitaciones de uso:

No aplicar en animales con hipersensibilidad conocida a los componentes de la formulación del producto y cuando hay cólico causado

por ileo y asociado a deshidratación. No utilice el producto en intoxicaciones por fármacos anticoagulantes o cuando existan signos de discrasias sanguíneas o alteración de la hemostasia. Debe evitarse la administración de flunixin meglumina en pacientes con lesiones del tracto gastrointestinal como úlceras y hemorragias o animales que padezcan enfermedades cardíacas, renales o hepáticos. Los pacientes con mayor riesgo de toxicidad renal por flunixin meglumina son aquellos que están deshidratados, en tratamiento concomitante con diuréticos o aquellos con disfunción renal, cardiovascular y/o hepática. No utilice el producto después de la fecha de caducidad. Después de abierto el frasco, el producto debe ser utilizado dentro de los 06 meses, siempre que se mantenga en condiciones adecuadas de almacenamiento, según el prospecto. No usar en yeguas gestantes

Interacciones medicamentosas:

No asociar ni usar concomitantemente con otros antiinflamatorios no esteroideos (AINEs) o corticoides. No usar concomitantemente con diuréticos. Se debe evitar la administración concurrente de fármacos potencialmente nefrotóxicos.

Reacciones adversas:

Ocasionalmente pueden ocurrir reacciones de sensibilidad individuales. En caso de reacción, busque inmediatamente un veterinario. Ocasionalmente pueden producirse reacciones locales, en el caso de la administración intramuscular, como hinchazón. El uso de medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) puede estar asociado con problemas gastrointestinales y renales. La disposición final de los envases vacíos o con contenido residual deberá efectuarse según las normas ambientales vigentes.

Tiempo de Retiro:

ATENCIÓN: CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES TIEMPOS DE RETIRO

BOVINOS

SACRIFICIO: EL SACRIFICIO DE ANIMALES TRATADOS CON ESTE PRODUCTO SÓLO

DEBE REALIZARSE 10 DÍAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN.

LECHE: LA LECHE DE ANIMALES TRATADOS CON ESTE PRODUCTO NO DEBE SER DESTINADA AL CONSUMO HUMANO HASTA 36 HORAS DESPUÉS DE LA ÚLTIMA APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.

EQUINOS:

SACRIFICIO: ESTE PRODUCTO NO DEBE SER APLICADO EN EQUINOS PRODUCTORES DE CARNE PARA CONSUMO HUMANO.

EL USO DEL PRODUCTO EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS INDICADAS EN ESTE PROSPECTO PUEDE PROVOCAR LA PRESENCIA DE RESIDUOS POR ENCIMA DE LOS LÍMITES APROBADOS, HACIENDO QUE EL ALIMENTO DE ORIGEN ANIMAL SEA IMPROPIO PARA EL CONSUMO.

Conservar el producto en su embalaje original, a una temperatura inferior a 30°C, protegido de la luz solar directa.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y LOS ANIMALES DOMÉSTICOS.

VENTA BAJO PRESCRICIÓN Y APLICACIÓN BAJO ORIENTACIÓN DEL MÉDICO VETERINARIO.

Responsable Técnica:

Dra. Caroline Della Nina Pistoni
CRMV/SP 24.508.

Importado y distribuido por:

Colombia: Reg.: 11452-MV – Ouro Fino Colombia S.A.S. – Calle 4 Sur 43 A 195
Oficina 222 Bloque B – Medellín, Colombia
– Tel.: (+57) 604 366-1429

Elaborado por:

Ourofino Saúde Animal Ltda.
Rod. Anhanguera SP 330, km 298
CEP: 14140 000 Cravinhos SP
CNPJ: 57.624.462/0001-05
Tel/Fax: 55 16 3518 2025
www.ourofinosaudeanimal.com
Hecho en Brasil